

**【常见症状】**

突发性耳聋的特点正确的是

- A. 原因明确
- B. 不是感音神经性
- C. 72 小时内听力急剧下降
- D. 有明显波动
- E. 双耳发病

**【正确答案】** C

**【答案解析】** 突发性耳聋是突然发生的原因不明的感音神经性耳聋, 多在 72 小时内听力急剧下降, 无明显波动, 多单耳发病, 常伴耳鸣, 也可伴有眩晕。

**【诊法】**

痛证与痰饮均可见的脉象是

- A. 滑脉
- B. 紧脉
- C. 动脉
- D. 牢脉
- E. 弦脉

**【正确答案】** E

**【答案解析】** 弦脉主病: 肝胆病、疼痛、痰饮, 或为胃气衰败者, 亦可见于老年健康者。

**【合理用药】**

糖皮质激素不用于下列哪种疾病的治疗

- A. 脑(腺)垂体前叶功能减退
- B. 中毒性休克
- C. 血小板减少症
- D. 急性粟粒性肺结核
- E. 骨质疏松

**【正确答案】** E

**【答案解析】** 糖皮质激素其应用涉及临床多个专科: ①超敏反应性疾病; ②风湿性疾病; ③严重急性细菌感染; ④自身免疫性疾病等。老年人用糖皮质激素易发生高血压及骨质疏松, 也应给予足够警惕, 切勿滥用。

**【常见病与多发病: 小儿疾病】**

小儿腹泻重度低渗性脱水, 伴有周围循环衰竭, 第 1 天补液, 首先用哪种液体

- A. 2: 1 含钠液
- B. 2: 3: 1 含钠液
- C. 3: 2: 1 含钠液
- D. 4: 3: 2 含钠液
- E. 2: 6: 1 含钠液

**【正确答案】** A

**【答案解析】** 重度脱水或有循环衰竭者, 应首先静脉推注或快速静脉滴入以扩充血容量, 改善血液循环及肾功能, 一般用 2: 1 等张含钠液 (2 份生理盐水

加 1 份 1.4%碳酸氢钠) 20ml/kg, 总量不超过 300ml, 于 30~60 分钟内静脉推注或快速滴入。



乡村全科助理医师考试:《答疑周刊》2019 年第 34 期 (word 版下载)  
【医学教育网版权所有, 转载务必注明出处, 违者将追究法律责任】

