

【儿童口腔医学】

常见的乳磨牙早失的原因是

- A. 外伤
- B. 先天缺失
- C. 严重的根尖周病变
- D. 局限的牙髓炎
- E. 牙列拥挤

【正确答案】C

【答案解析】

此题可用排除法,外伤较少伤及后牙;先天性缺失较少见;局限性牙髓炎较少引起乳磨牙缺失;牙列拥挤也不会造成乳磨牙缺失。因此选严重的根尖周病变导致牙槽骨的吸收从而导致乳磨牙的缺失。

【儿童口腔医学】

乳牙早失的原因,叙述正确的

- A. 严重龋病,牙髓病和根尖周病
- B. 恒牙异位萌出,乳牙根过早吸收
- C. 外伤导致
- D. 先天性牙齿缺失
- E. 以上均正确

【正确答案】E

【答案解析】

牙齿早失的原因如下:①严重龋病、牙髓病及根尖周病导致牙齿过早脱落或被移除;②恒牙异位萌出,乳牙根过早吸收脱落;③牙齿因外伤脱落;④先天性牙齿缺失。

【牙周病学】

龈切除手术后,塞治剂拆除时间一般是

- A. 1~4天
- B. 5~7天
- C. 7~8天
- D. 10~12天
- E. 14~15天

【正确答案】B

【答案解析】

龈切除手术后,塞治剂拆除时间一般为5~7天。

【牙周病学】

药物增生的牙龈肥大起始于

- A. 舌侧龈乳头
- B. 腭侧龈乳头
- C. 近中龈乳头
- D. 远中龈乳头
- E. 唇颊侧龈乳头

【正确答案】E

【答案解析】

增生起始于唇颊侧或舌腭侧龈乳头，呈小球状突起于牙龈表面。

