



【常见病与多发病: 运动系统】

在类风湿关节炎中, 最常受累关节是

- A. 脊柱关节
- B. 髋关节
- C. 膝关节
- D. 远端指间关节
- E. 近端指间关节

【正确答案】E

【答案解析】类风湿关节炎可侵犯周围小关节和大关节, 但以近端指间关节、掌指关节、腕关节及足关节最常见, 其次为肘、肩、踝、膝、颈、颞颌及髋关节。远端指间关节和脊柱关节(颈椎除外)极少受累。

【常见病与多发病: 小儿疾病】

小儿腹泻重度低渗性脱水, 伴有周围循环衰竭, 第 1 天补液, 首先用哪种液体

- A. 2: 1 等张含钠液
- B. 2: 3: 1 含钠液
- C. 3: 2: 1 含钠液
- D. 4: 3: 2 含钠液
- E. 2: 6: 1 含钠液

【正确答案】A

【答案解析】重度脱水或有循环衰竭者, 应首先静脉推注或快速静脉滴入以扩充血容量, 改善血液循环及肾功能, 一般用 2: 1 等张含钠液(2 份生理盐水加 1 份 1.4% 碳酸氢钠) 20ml/kg, 总量不超过 300ml, 于 30~60 分钟内静脉推注或快速滴入。

【急诊与急救: 常见损伤与骨折】

关于脊柱外伤与脊髓损伤的关系的叙述, 下列哪项是错误的

- A. 脊髓损伤节段与椎骨受伤平面不一致
- B. 胸椎较固定, 所以胸椎骨的脱位多无脊髓损伤
- C. 有的病例表现为明显脊髓损伤, 但 X 线片却无骨折脱位
- D. 屈曲型骨折脱位造成脊髓损伤最多见
- E. 椎管狭窄患者, 脊柱创伤更易发生脊髓损伤

【正确答案】B

【答案解析】A. 脊髓损伤节段与椎骨受伤平面不一致: 正确, 存在几个椎体的差异。

B. 胸椎较固定, 所以胸椎骨的脱位多无脊髓损伤: 没有这个说法。

C. 有的病例表现为明显脊髓损伤, 但 X 线片却无骨折脱位: 正确, 比如脊髓震荡

D. 屈曲型骨折脱位造成脊髓损伤最多见: 正确, 一般脊柱受到损伤, 都是因为强大的外力作用。

E. 椎管狭窄患者, 脊柱创伤更易发生脊髓损伤: 狭窄本身会加重损伤。

【诊法】

以下哪项不是面色发青所属病证

- A. 痛证
- B. 寒证
- C. 惊风
- D. 水饮
- E. 血瘀

【正确答案】D

【答案解析】青色主寒证、气滞、血瘀、疼痛和惊风。选项 D 中水饮是属于黑色的主病。故此题与题干符合的最佳选项是 D。

乡村全科助理医师考试:《答疑周刊》2019 年第 38 期 (word 版下载)

〔医学教育网版权所有, 转载务必注明出处, 违者将追究法律责任〕