

医学教育网中医执业医师《答疑周刊》2020 年第 11 期

【中医诊断学】

结脉与代脉的主要区别在于（ ）

A. 节律不同

B. 至数不同

C. 脉力不同

D. 脉位不同

E. 流利度不同

学员提问：为什么选 A？

答案与解析：本题答案为 A。

结脉：脉来缓慢，时有中止，止无定数。

代脉：脉来一止，【医学教育网原创】止有定数，良久方还。

故本题答案选 A。

【方剂学】

四逆散配伍中体现“一升一降，升清降浊”作用的药物是（ ）

A. 柴胡、芍药

B. 甘草、枳实

C. 枳实、芍药

D. 柴胡、甘草

E. 柴胡、枳实

学员提问：为什么选 E？

答案及解析：本题答案为 E。

四逆散以柴胡为君，入肝胆经，升发阳气，疏肝解郁，透邪外出。以白芍为臣，敛阴养血柔肝。柴胡与白芍配伍，补养肝血，条达肝气，【医学教育网原创】使柴胡升散而无耗伤阴血之弊。以枳实为佐，理气解郁，泄热破结。柴胡与枳实配伍，一升一降，舒畅气机，升清降浊；白芍与枳实配伍，理气和血，调和气血。炙甘草为使药，调和诸药，益脾和中。四药合用，透邪解郁，疏肝理脾，能使邪去郁解，**气血调畅，清阳得伸**，四逆自愈。

故本题答案选 E。

### 【诊断学基础】

下列各项，可出现脉压减少的是（ ）

A. 主动脉瓣关闭不全

B. 缩窄性心包炎

C. 动脉导管未闭

D. 甲状腺功能亢进症

E. 严重贫血

学员提问：为什么选 B？

答案及解析：本题答案为 B。

脉压  $>40\text{mmHg}$  称为脉压增大，见于主动脉瓣关闭不全、动脉导管未闭、动静脉瘘、高热、甲状腺功能亢进症、严重贫血、动脉硬化等。【医学教育网原创】脉压  $<30\text{mmHg}$  称为脉压减小，见于主动脉瓣狭窄、心力衰竭、休克、心包积液、缩窄性心包炎等。

故本题答案选 B。

### 【中医内科学】

与眩晕发病关系密切的脏腑是（ ）

A. 肺、脾、肾

B. 心、肝、肾

C. 肺、心、肾

D. 肝、脾、肾

E. 肺、肝、肾

**学员提问：**为什么选 D？

**答案及解析：**本题答案选 D。

眩晕的基本病机主要是脑髓空虚，清窍失养，或痰火上逆，【医学教育网原创】扰动清窍。本病的病位在于头窍，其病变脏腑与肝、脾、肾三脏相关。眩晕的病性以虚者居多，气虚血亏、髓海空虚、肝肾不足所导致的眩晕多属虚证。

故本题答案选 D。

**【中医外科学】**

红丝疔的好发部位是（ ）

- A. 面部
- B. 胸腹部
- C. 四肢后侧
- D. 四肢内侧
- E. 四肢外侧

**学员提问：**为什么选 D？

**答案及解析：**本题选 D。

红丝疔是发于四肢，皮肤呈红丝显露，【医学教育网原创】迅速向上走窜的急性感染性疾病。其特点是先有手足疔疮或皮肤破损，红肿热痛，继则患肢内侧皮肤出现红丝一条或数条，迅速向躯干方向走窜，可伴恶寒发热等症状，邪毒重者可内攻脏腑，发生走黄。

故本题答案选 D。