

主管护师：《答疑周刊》2020 年第 41 期

1. 【问题】排卵性功血与无排卵性功血的区别？

【解答】

分类/类型	排卵性	无排卵性
好发时期	生育年龄	青春期和绝经过渡期
发病机制	黄体功能不全和子宫内膜不规则脱落	青春期一下丘脑-垂体-卵巢轴调节功能未发育成熟； 绝经过渡期—卵巢功能衰退
临床表现	黄体功能不足—月经周期缩短； 子宫内膜不规则脱落—月经周期正常，经期延长，出血量多	不规则子宫出血（最常见）， 月经周期紊乱，经期长短不一， 出血量时多时少，多有大量出血， 也可由长时间少量出血， 淋漓不断。有贫血，一般无腹痛。
基础体温测定	双相型	单相型
治疗原则	恢复黄体功能	青春期及生育期—止血、调整周期、促排卵； 绝经过渡期—止血、调整周期、 减少经量、防止子宫内膜病变

2. 【问题】

A. 每分钟 0.5L

B. 每分钟 1L

C. 每分钟 1.5L

D. 每分钟 1~3L

E. 每分钟 4L

①面罩法给氧的氧流量为

②头罩法给氧的氧流量为

【正确答案】D；E

【学员问题】学员对这道题的每分钟的氧流量有疑问？

【解答】鼻导管给氧：婴幼儿 0.5~1L/min，氧浓度 25%~40%；面罩吸氧：婴幼儿氧流量是 2~4L/min，儿童氧浓度 40%~60%；头罩吸氧：氧浓度可根据需要调节，流量 4~6L/min，氧浓度 40%~50%。根据题干选择最接近最符合的选项。

3. 【问题】漏出液和渗出液的区别？

【解答】

项目	漏出液	渗出液
病因	非炎症性	炎症性、外伤、肿瘤等
颜色	淡黄色	黄色、红色、乳白色
透明度	清晰透明或琥珀色	浑浊或乳糜样
比重	<1.015	>1.018
凝固性	不易凝固	易凝固
Rivalta 试验	阴性	阳性
蛋白定量 (g/L)	<25	>30
积液蛋白/血清蛋白	<0.5	>0.5
积液 LD/血清 LD	<0.6	>0.6
细胞总数 ( $\times 10^6/L$ )	<100	>500
有核细胞分类	淋巴细胞为主,可见间皮细胞	炎症以中性粒细胞为主,慢性炎症或恶性积液以淋巴细胞为主
细菌	无	有

4.【问题】缺血性脑血管病和出血性脑血管病的区别？

【解答】

项目	缺血性		出血性	
	脑梗形成	脑栓塞	脑出血	蛛网膜下腔出血
发病年龄	老年人	青壮年	中老年	各年龄均有，青壮年为主
常见病史	动脉粥样硬化	各种心脏病	高血压及动脉硬化	动脉瘤血管畸形
起病时状态	静态时	不定，由静态到动态时	动态（激动、活动）时	动态（激动、活动）时
起病缓急	较缓	最急	急	急骤
头痛、呕吐	多无	少有	多有	剧烈、多见
血压	正常或增高	多正常	明显增高	正常或增高
瞳孔	多正常	多正常	患侧有时大	多正常
偏瘫	多见	多见	多见	无
脑膜刺激征	无	无	可有	明显
脑脊液	多正常	多正常	压力增高，含血	压力增高、血性
CT 检查	低密度灶	低密度灶	高密度灶	蛛网膜下高密度灶