

2021 年公卫执业医师：《答疑周刊》第 30 期

【医学心理学】

心理评估常用方法不包括

A.调查法

B.投射法

C.观察法

D.作品分析法

E.会谈法

【正确答案】B

【答案解析】医学心理中心理评估的常用方法如下：

①调查法，调查法包括历史调查和现状调查两个方面。

②观察法，这里所指的观察法是通过对被评估者行为表现直接或间接（通过摄影录像设备）的观察或观测而进行心理评估的一种方法。

③会谈法，会谈法也有称做“交谈法”、“晤谈法”等。其基本形式是一种面对面的语言交流，也是心理评估中最常用的一种基本方法。

④作品分析法，作品分析法也称产品分析法。所谓“作品”指被评估者所做的日记、书信、图画、工艺等文化性的创作，也包括了他（她）生活和劳动过程中所做的事和东西。通过分析这些作品（产品）可以有效地评估其心理水平和心理状态，并且可以作为一个客观依据留存。

⑤心理测验法，在心理评估中，心理测验占有十分重要的地位。心理测验可以对心理现象的某些特定方面进行系统评定，并且测验一般采用标准化、数量化的原则，所得到的结果可以参照常模进行比较，避免了一些主观因素的影响。

【医学心理学】

“比奈-西蒙量表”属于一种

A.智力测验

B.人格测验

C.神经心理测验

D.评定量表

E.投射测验

【正确答案】A

【答案解析】“比奈—西蒙量表”是 1905 年法国的心理学家比奈受当时的法国教育当局的委托，为筛选小学入学儿童中的智力发育障碍者而与他的学生西蒙一起编制的一套智力测验。这是世界上最早出现的正式的心理测验，具有划时代意义，因此在心理测量的历史上非常著名。也因此其他选项是不正确的。

【卫生统计学】

下列抽样方法中需要按混杂因素（非研究因素）将总体分为若干组的方法是

A.单纯随机抽样

B.系统抽样

C.随意抽样

D.分层抽样

E.机械抽样

【正确答案】D

【答案解析】分层抽样是先将总体中全部个体按对主要研究指标影响较大的某种特征分成若干“层”，再从每一层内随机抽取一定数量的观察单位组成样本。

【卫生统计学】

调查研究和实验研究最主要的区别在于是否

A.随机

B.重复

C.施加处理因素

D.设置对照

E.分布均衡

【正确答案】C

【答案解析】流行病学实验研究是指研究者将研究对象随机分配到试验组和对照组，对试验组人为地施加或减少某种因素，随访观察一段时间，然后比较和分析各组人群的结局，从而判断处理因素的效果。人为施加的干预措施是与调查研究的一个根本不同点。