

医学教育网中医执业医师: 《答疑周刊》2023年第25期

问题索引:

1. 实喘与虚喘如何区分?
2. 扁桃体肿大如何分度?
3. 溃疡性结肠炎的消化系统表现有哪些?

具体解答:

1. 实喘与虚喘如何区分?

以下哪项不是实喘的特征

- A. 发作急骤
- B. 呼吸深长
- C. 息粗声高
- D. 呼多吸少
- E. 张口抬肩

【答案】D

【解析】实喘: 发作急骤, 呼吸深长, 息粗声高, 唯以呼出为快者, 为实喘。多为风寒袭肺或痰热壅肺、痰饮停肺, 肺失宣肃, 或水气凌心所致。

虚喘: 病势缓慢, 呼吸短浅, 急促难续, 息微声低, 唯以深吸为快, 动则喘甚者, 为虚喘。是肺肾亏虚, 气失摄纳, 或心阳气虚所致。

D为虚喘的表现[医学教育网原创]。

2. 扁桃体肿大如何分度?

关于扁桃体肿大, 叙述正确的是

- A. I度肿大为刚超过咽腭弓
- B. II度肿大为达到中线
- C. 超过咽腭弓而未达到中线是III度肿大
- D. 扁桃体肿大共分IV度
- E. 达到并超过中线为扁桃体III度肿大

【答案】E

【解析】扁桃体肿大分为三度：I度肿大时扁桃体不超过咽腭弓；II度肿大时扁桃体超过咽腭弓，介于I度与III度之间；III度肿大时扁桃体达到或超过咽后壁中线[医学教育网原创]。

3. 溃疡性结肠炎的消化系统表现有哪些？

不属溃疡性结肠炎主要临床表现的是

- A. 里急后重
- B. 腹部包块
- C. 腹痛
- D. 腹泻
- E. 黏液脓血便

【答案】 B

【解析】 溃疡性结肠炎的消化系统表现：

(1) 腹泻：为最主要的症状，常反复发作或持续不愈，轻者每天排便2~4次，便血轻或无。重者排便频繁，脓血显见，甚至大量便血。黏液血便是本病活动期的重要表现。病变局限在直肠者，鲜血附于粪便表面；病变扩展至直肠以上者，血液混于粪便中。病变累及直肠时，可有里急后重。

(2) 腹痛：轻型患者在病变缓解期可无腹痛，或仅有腹部不适，部位多在左下或下腹部，亦可涉及全腹，有疼痛→便意→排便→缓解的规律。

(3) 体征：轻中型患者仅左下腹部压痛，有些患者可触及呈管状的乙状结肠。若有腹肌紧张、反跳痛、肠鸣音减弱，应警惕结肠扩张、肠穿孔等并发症[医学教育网原创]。